

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada (TC) é um exame que utiliza raios-x para a construção de imagens com alta resolução do corpo humano. O paciente fica deitado na mesa de exame e quando ela começa a se mover, as imagens são adquiridas em poucos segundos. Alguns exames necessitam que o paciente segure a respiração por alguns segundos e pode ser necessária mais de uma aquisição das imagens. Gestantes não devem realizar tomografia computadorizada em virtude da radiação ionizante, salvo em situações excepcionais e de emergência, a depender de critério médico.

JEJUM

- Se o exame for com sedação, o período de jejum é de 08h para líquidos e sólidos, independente do tipo de exame que será realizado.
- Se o exame for sem sedação e for da região do abdome ou da pelve (ex.: abdome superior, pelve, abdome total, urotomografia, enterotomografia etc), o período de jejum é de 04h para sólidos. Líquidos podem ser ingeridos a qualquer momento.
- Se o exame for sem sedação e de outras regiões, não há necessidade de jejum.

EXAMES ESPECÍFICOS

- Se o exame for enterotomografia (Entero-TC), será necessário realizar um preparo no momento do exame, com ingestão de uma medicação de efeito laxante, dessa forma, sugerimos não agendar compromissos logo em seguida ao exame.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Informe na entrevista se deseja direcionar seu exame para um médico específico avaliar.
- Não há necessidade de suspender medicações no dia do exame, que podem ser ingeridas com pequena quantidade de água.
- Não há necessidade de suspender aleitamento materno.
- Remover piercings ou outros adornos metálicos, bem como aparelho ortodôntico removível, se estiverem na região que será examinada.
- Trazer exames anteriores relacionados ao exame atual.
- Poderá ser necessária a utilização de meio de contraste endovenoso, por via oral ou retal, a depender do pedido médico e da orientação do médico radiologista responsável pelo exame.
- Caso tenha sido solicitado no agendamento ou na confirmação do exame, favor trazer exame de creatinina e utilizar eventuais medicações indicadas nos horários informados.